

ЯБЛУНЯ

ЗАМОЧУ- ВАННЯ САД- ЖАНЦІВ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ (РОЖЕВИЙ БУТОН)	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ	ЗАВ'ЯЗЬ	ЛІСОВИЙ ГОРІХ	ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ	ЗБІЛЬШЕН- НЯ ПЛОДУ	ДОЗРІВАННЯ	ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ
ВІГОР- ТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-8 годин	ВІГОРТЕМ-С 0,15-0,2 кг/га		ЦТА СТИ- МУЛЯНТ-4 0,4-0,6 л/га	ВІГОРТЕМ-С 0,15-0,2 кг/га		ВІГОР- ТЕМ-С 0,1-0,2 кг/га	КАФОМ Mg 1,0-1,5 л/га	КАФОМ Zn 1,0 л/га
	КАФОМ Zn 1,2-1,5 л/га		СТІМАКС ПЛЮС** 30-50 мл /100 л води	МЕРІСТЕМ НРК* 1,5-3,0 кг/га	ЦТА СТИ- МУЛЯНТ-4 0,4-0,6 л/га	КАФОМ К 1,0-1,2 л/га	СТІМАКС ФРУТ** 200-300 мл /100 л води	
	СТІМАКС ФЛАВЕР** 150-250 мл /100 л води				МЕРІСТЕМ НРК* 1,5-3,0 кг/га	СТІМАКС ФРУТ** 200-300 мл /100 л води	АМІНО- МАКС Ca 1,5-2,5 л/га	
					КАФОМ К 1,0-1,5 л/га	АМІНО- МАКС Ca 1,5-2,5 л/га	КАФОМ Ca 1,5-2,5 л/га	
				КАФОМ Mg 1,0-1,5 л/га	КАФОМ Ca 1,5-2,5 л/га			

* Формула НРК обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.