

СУНИЦЯ САДОВА

ПЕРЕСАДКА, ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ	ВІДРОСТАННЯ КВІТКОНОСІВ	БУТОНІЗАЦІЯ	РІСТ ЯГІД	ДОЗРІВАННЯ	ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕЗИМІВЛІ
ВІГОРТЕМ-С 2 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 5 кг/га полив	МЕРІСТЕМ NPK* 10 кг/га полив	КАФОМ Са 1,0 л/га позакореневе живлення		ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 1,0 л/га позакореневе живлення
	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,5 л/га позакореневе живлення	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 1,0 л/га позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Cu 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Са 1,0 л/га позакореневе живлення
	ЕТАБОРО 0,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Са 1,0 л/га позакореневе живлення	СТІМАКС ПЛЮС** 20-30 мл /100 л води позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ К 4,0 л/га полив
	КАФОМ Mg 0,5 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Cu 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ К-Mg 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ К-Mg 1,0 л/га позакореневе живлення	КАФОМ Zn-Mn 1,0 л/га позакореневе живлення
	КАФОМ Са 0,5 л/га позакореневе живлення	СТІМАКС ФЛАВЕР** 100-200 мл /100л води позакореневе живлення		СТІМАКС ФРУТ** 100-150 мл /100 л води позакореневе живлення	ЕТАБОРО 1,0 л/га позакореневе живлення
				КАФОМ К 4,0 л/га полив	
				КАФОМ Zn-Mn 1,0 л/га позакореневе живлення	



* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Químicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.