

КВІТИ

РОЗСАДА	ВЕГЕТАЦІЯ	БУТОНІЗАЦІЯ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	ДО ЗРІЗКИ	ДРУГА ХВИЛЯ ВЕГЕТАЦІЇ	ДО ЗРІЗКИ
ВІГОРТЕМ-С 5 г/10 л води полив	ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,12 кг/га позакореневе живлення/ фертигація	АМІНОМАКС Са 0,2-0,3 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 50-80 мл на сотку позакореневе живлення/ фертигація	КАФОМ Mg 0,2-0,3 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,12 кг/га позакореневе живлення/ фертигація	КАФОМ Mg 100 мл на сотку позакореневе живлення/ фертигація
	МЕРІСТЕМ NPK* 2-3 кг/га позакореневе живлення/ фертигація	КАФОМ К 0,2-0,3 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація		КАФОМ Са 0,2-0,3 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	МЕРІСТЕМ NPK* 2-3 кг/га позакореневе живлення/ фертигація	АМІНОМАКС Са 0,2-0,25 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація
	КАФОМ Mg 0,2-0,3 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	ЕТАБОРО 0,3-0,5 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація			КАФОМ Mg 0,2-0,25 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 60 мл на сотку позакореневе живлення/ фертигація
					ЕТАБОРО 0,3-0,5 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	
					АМІНОМАКС N 0,2-0,25 л/100 л води позакореневе живлення/ фертигація	



* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

* Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.