ЧЕРЕШНЯ

ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ. ОПАДАННЯ ПЕЛЮСТОК	УТВОРЕННЯ ЗАВ'ЯЗІ	ПОЧАТОК ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ	МАСОВЕ ДОЗРІВАННЯ ПЛОДІВ
ВІГОРТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-10 годин	**СТІМАКС ФЛАВЕР**** 150-200 мл /100л води	**ВІГОРТЕМ-С** 0,2 кг/га		**СТІМАКС ФРУТ**** 200-250 мл /100 л води	
		ЕТАБОРО 1,0 л/га	**ЦТА СТИМУ-ЛЯНТ-4** 0,25 л/га	**КАФОМ Ca** 1,5-2,0 л/га	**АМІНОМАКС Ca** 1,0-1,2 л/га
		АМІНОМАКС N 1,0 л/га	**СТІМАКС ПЛЮС**** 30-40 мл /100 л води	**АМІНОМАКС Ca** 1,0-1,5 л/га	
		КАФОМ K-Mg 1,0-1,2 л/га	**ЕТАБОРО** 0,3 л/га		
			КАФОМ K 1,0 л/га		
			АМІНОМАКС N 0,75-1,0 л/га		
			КАФОМ K-Mg 0,75-1,0 л/га		



* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.