

ГРУША



ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ	РІСТ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОДУ	НАЛИВ ПЛОДУ
ВІГОРТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-8 годин	ВІГОРТЕМ-С 0,15-0,2 кг/га		ВІГОРТЕМ-С 0,2 кг/га	КАФОМ К 0,5 л/га"
	СТІМАКС ФЛАВЕР** 150-250 мл /100 л води	ЦТА СТИМУ- ЛЯНТ-4 0,25 л/га	МЕРІСТЕМ NPK* 1,5-3,0 кг/га	СТІМАКС ФРУТ** 200-300 мл /100л води
		СТІМАКС ПЛЮС** 30-50 мл /100 л води	ЕТАБОРО 0,3 л/га	КАФОМ Са 1,5 л/га
			КАФОМ К 1,2-1,5 л/га	
			КАФОМ Mg 1,0 л/га	
			СТІМАКС ФРУТ** 200-300 мл /100 л води	

* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіді Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.