

СЛИВА

ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ	ФОРМУВАННЯ ОСІ ЦВІТІННЯ	РОЗПУСКАННЯ ЛИСТОЧКІВ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ. ОПАДАННЯ ПЕЛЮСТОК	УТВОРЕННЯ ЗАВ'ЯЗІ	РІСТ ПЛОДІВ	ДОЗРІВАННЯ
ВІГОРТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-8 годин	ВІГОРТЕМ-С 0,2 кг/га		СТІМАКС ФЛАВЕР** 150-200 мл /100 л води	ВІГОРТЕМ-С 0,2 кг/га			КАФОМ К 1,0 л/га
	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,5-0,75 л/га			АМІНОМАКС N 1,0 л/га	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,3 л/га		СТІМАКС ФРУТ** 200-250 мл /100 л води
	ЕТАБОРО 1,0 л/га			СТІМАКС ПЛЮС** 30-40 мл /100 л води	АМІНОМАКС N 1,0 л/га	СТІМАКС ПЛЮС** 30-40 мл /100 л води	КАФОМ Са 1,5-2,0 л/га
				ЕТАБОРО 0,3 л/га	СТІМАКС ПЛЮС** 30-40 мл /100 л води	ЕТАБОРО 0,3 л/га	
				КАФОМ К-Mg 0,75-1,0 л/га	ЕТАБОРО 0,3 л/га	КАФОМ К-Mg 0,75-1,0 л/га	
					КАФОМ К-Mg 0,75-1,0 л/га	МЕРІСТЕМ NPK* 1,5-3,0 кг/га	
					КАФОМ К 0,7-1,0 л/га	СТІМАКС ФРУТ** 200-250 мл /100 л води	
						КАФОМ Са 1,0-1,5 л/га	



* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.