

ПЕРСИК

ЗАМОЧУВАННЯ САДЖАНЦІВ	ФОРМУВАННЯ ОСІ ЦВІТІННЯ	ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ	РОЗПУСКАННЯ ЛИСТОЧКІВ	КІНЕЦЬ ЦВІТІННЯ. ОПАДАННЯ ПЕЛЮСТОК	УТВОРЕННЯ ЗАВ'ЯЗІ	РІСТ ПЛОДІВ	ДОЗРІВАННЯ
ВІГОРТЕМ-С 20 г/10 л води Експозиція 6-10 годин	ВІГОРТЕМ-С 0,2 кг/га	СТІМАКС ФЛАВЕР** 150-200 мл /100 л води	ВІГОРТЕМ-С 0,2 кг/га				КАФОМ К 1,0 л/га
	ЕТАБОРО 1,0 л/га			ЕТАБОРО 0,3-0,4 л/га	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,3 л/га		СТІМАКС ФРУТ** 200-250 мл /100 л води
	ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 0,5-0,75 л/га			КАФОМ К-Mg 0,75-1,0 л/га	ЕТАБОРО 0,3-0,4 л/га	ЕТАБОРО 0,3 л/га	КАФОМ Ca 1,5-2,0 л/га
				АМІНОМАКС N 1,0 л/га	КАФОМ К-Mg 0,75-1,0 л/га	МЕРІСТЕМ NPK* 1,5-3,0 кг/га	
					СТІМАКС ПЛЮС** 30-40 мл /100 л води	СТІМАКС ФРУТ** 200-250 мл /100 л води	
					КАФОМ К 0,7-1,0 л/га	КАФОМ Ca 1,0-1,5 л/га	
					АМІНОМАКС N 1,0 л/га		

* Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби насаджень.

** Біостимулятори Стімакс не рекомендовано змішувати у одній баковій суміші з іншими біостимуляторами та фунгіцидами.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану насаджень.