

ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (ОЗИМІ)

ОБРОБКА НАСІННЯ	4-5 ЛИСТКІВ, ПОЧАТОК КУЩЕННЯ (ОСІНЬ)	КУЩЕННЯ	ВИХІД У ТРУБКУ	КОЛОСІННЯ	ЦВІТІННЯ	МОЛОЧНА СТИГЛІСТЬ
ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,5 кг/т або СТІМАКС СІДС 0,2-0,5 л/т	ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,2 кг/га			МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га		
КАФОМ Zn-Mn (Zn, Cu) 1,0-1,2 л/т насіння	КАФОМ Zn-Mn (Zn, Cu)* 0,75-1,5 л/га	КАФОМ Zn-Mn (Zn, Cu)* 1,0-1,2 л/га	ЦТА СТИМУ-ЛЯНТ-4*** 0,2-0,4 л/га			СТІМАКС ФРУТ 0,4-0,8 л/га
		МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га				АМІНОМАКС N 0,6-1,0 л/га
		ЦТА СТИМУЛЯНТ-4*** 0,2-0,4 л/га				

ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (ЯРІ)

ОБРОБКА НАСІННЯ	4-5 ЛИСТКІВ, ПОЧАТОК КУЩЕННЯ	КУЩЕННЯ	ВИХІД У ТРУБКУ	КОЛОСІННЯ	ЦВІТІННЯ	МОЛОЧНА СТИГЛІСТЬ
ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,5 кг/т або СТІМАКС СІДС 0,2-0,5 л/т	ВІГОРТЕМ-С 0,1-0,2 кг/га			МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га		
КАФОМ Zn-Mn (Zn, Cu) 1,0-1,2 л/т		КАФОМ Zn-Mn (Zn, Cu)* 1,0-1,2 л/га	ЦТА СТИМУ-ЛЯНТ-4*** 0,2-0,4 л/га			СТІМАКС ФРУТ 0,4-0,8 л/га
		МЕРІСТЕМ NPK** 1,0-2,0 кг/га				АМІНОМАКС N 0,6-1,0 л/га
		ЦТА СТИМУЛЯНТ-4*** 0,2-0,4 л/га				

* Увага! Не змішувати з препаратами міді та фосфорорганічними інсектицидами! При застосуванні у баковій сіміші з препаратами БОРУ обов'язково проводити тест на змішування. У воді з великим вмістом розчинених солей кальцію можливе випадання осаду.

** Формула NPK обирається та застосовується відповідно до потреби посівів.

*** Особлива доцільність застосування препарату разом з фунгіцидом проти фузаріозу колосу на початку цвітіння.

Примітка. Дана програма являється загальною рекомендацією та розроблена на основі довіду Quimicas Meristem та ПЛАНТА ГРУПП. Вона може слугувати загальною інструкцією і повинна застосовуватись індивідуально у відповідності до місцевості та стану посівів.